

Uva'aemyj pacient!

Vav vrah poprosil vas sdat; dlq analiza mohu, sobrannu[za 24 hasa. Esli posle prohteniq /toj informacii u vas vozniknut voprosy, to pozvonite po telefonu 612-863-4678. Prohtite vse instrukcii preded tem, kak nahat; sbor mohi.

Dlq sbora mohi vam dali libo odin kontajner emkost;[3000 ml, libo sdvoennye kontejnery. Dlq iskl[heniq owibok na ka'dom kontejnere na /tiketke nu'no napisat; imq i famili[, datu i vremq nahala sbora mohi. Ispol;zujte ruhku ili flomaster s ne rasplyva[limisq ot vlagi hernilami.

Predupre'denie: V kontejnere dlq sutohnogo sbora mohi mo'et naxodit;sq krepkij rastvor kisloty ili drugogo konservanta. ?ti ximikalii pri popadanii na ko'u mogut vyzvat; o'og, oni mogut predstavljt; opasnost; pri popadanii v glaza, ili pri vdyxanii ix parov. Prohitajte predupre'denie na /tiketke. Ne vylivajte konservant iz kontejnera. Bud;te ostoro'ny v nahale sbora mohi. Esli na kontejnere ne imeetsq /tiketki s predupre'deniem, to /tot kontejner ne soder'it takix ximikalij.

Instrukciq:

1. Utrom pomohites; i vylejte pervu[porci[mohi v tualet. Zapiwite tohnoe vremq.
2. VSQ ostal;naq moha za sutki dol'na byt; sobrana v vydannyj dlq /togo kontejner.
3. Poslednee kolihestvo mohi dol'no byt; vydeleno tohno herez 24 hasa posle pervogo. ?ta poslednqq proba dol'na byt; dobavlena k sobrannoj za sutki mohe.
4. Vo vremq sbora mohi rekomenduetsq vypivat; obychnoe kolihestvo 'idkosti. Alkokol;nye napitki upotreblqt; ne sleduet.
5. Vo vremq sbora kontejner s mohoj nu'no der'at; v xolodil;nike ili postavit; na led.
6. Po okonhanii sutohnogo sbora mohi nu'no bez promedlenij dostavit; kontejner v laboratorii[.

Sdvoennyj kontejner # Razdeleine obrazca:

- Vlivat; bystro, nepreryvnoj struej.
- Posle zaverweniq sbora obrazca ostoro'no udalit; razdelitel;nu[voronku iz kontejnerov.
- Otverstiq v kontejnerax zakryt; krasnymi probkami.
- Polo'it; razdelitel;nu[voronku v prilagaemyj plastikovyj mewok i vybrosit; v musor.

PERVAQ POMO}: PRI PORA"ENII XIMIKALIQMI, SODER"A}IMISQ V KONTEJNERAX DLQ SUTOHNOGO SBORA MOHI.

VDYXANIE:

NEL:ZQ VDYXAT: PARY XIMIKALIEV. Pri popadanii parov v legkie vyvesti postradavwego na sve'ij vozdux. Esli on ne dywit, delat; iskusstvennoe dyxanie. Esli dyxanie zatrudneno, dat; kislorod. Pozvonit; vrahu.

PROGLATYVANIE:

NE VYZYVAT: RVOTU. Davat; vodu v bol;wom kolihestve ili, esli est;, moloko. Zapre]aetsq davat; hto-libo herez rot heloveku, poterqvwemu soznanie. Nemedlenno obratit;sq za medicinskoj pomol;[.

POPADANIE NA KO"U:

Pri popadanii na ko'u nemedlenno promyvati; bol;wim kolihestvom vody v tehenie ne menee 15 minut, snqv pri /tom ode'du i obuv;, na kotorye popali ximikalii. Pozvonit; vrahu.

POPADANIE V GLAZA:

Promyvati; v tehenie ne menee 15 minut bol;wim kolihestvom vody, periodiheski otodvigat; ni'nee i verxnee veko. Nemedlenno obratit;sq za medicinskoj pomol;[.

Spasibo.

Medicinskie laboratorii Ob=edineniq Allina